

MAKÜ Hoof Jel (Tırnak Bakım Ürünü)

Ürün Özellikleri: MAKÜ Hoof Jel bileşimindeki; Hamamelis Virginia Ekstratı, Aloe Vera Ekstratı, Çay Ağacı Yağı gibi aromatik bileşenler tırnak ve ayak bölgelerindeki oluşan yaraların kapanmasını sağlar ve iyileşme sürecine olumlu etki yapar. Potasyum İyodür, Monopropilen Glikol tırnak ve ayağın maruz kaldığı dış etkilere ve hastalık etkenlerine karşı tırnak ve ayağı korur. Gliserin nemlendirici etki yapar, Çinko minerali tırnakların direncini etkili ve devamlı bir şekilde destekler. Ksantan zamkı yapıştırıcı ve yapısal özelliği ile ürünün uygulama noktasına hızla nüfuz eder ve uzun süreli etkinlik sağlar. MAKÜ Hoof Jel bütün bu özellikleri ile üstün tırnak ve ayak bakım ürünüdür.

Ürün Bileşimi: Hamamelis Virginia Ekstratı, Çay Ağacı Yağı, Aloe Vera Ekstratı, Potasyum İyodür, Monopropilen Glikol, Gliserin, Ksantan Gum, Çinko Oksit ve Su içeren sarımsı kahverengi renkli bir jeldir.

Kullanım Amacı: Sığır, koyun, keçi ve atların ayak ve tırnak problemlerinde ve toplallıklarında tedaviye yardımcı olarak kullanılır. Bu çerçevede DİGİTAL DERMATİTİS, İNTERDİGİTAL FLEGMON, LAMİNİTİS, İNTERDİGİTAL DERMATİTİS, TABAN ÖKÇE ÇÜRÜĞÜ gibi hastalıkların bireysel tedavisine yardımcı olur.

Ürün Kullanım Şekli ve Dozu: Tırnaklar iyici temizlenip kurutulduktan sonra kesimi yapılarak MAKÜ Hoof Jel bir fırça yardımı ile tırnak bölgesi, tırnak arası ve taban kısmını kaplayacak şekilde sürülür. Uygulandığı yerde süratle kuruyan bu ürün bandaj gerektirmez. İhtiyaca göre işlem 2-3 defa tekrarlanabilir.

Ürün Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü: Ürün kutusunda, oda ısısında, direkt güneş ışığından ve rutubetten uzakta muhafaza edilmelidir. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

Genel Uyarılar: Gıda malzemelerinden uzakta, çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Kullanmadan önce kullanma talimatlarına uyunuz. Sadece hedef hayvan türlerinde kullanınız.



Ökçe erozyonu

Uygulama öncesi



Uygulama sonrası



Foot rot

Uygulama öncesi



Uygulama sonrası



Taban ülseri

Uygulama öncesi



Uygulama sonrası



İnterdigital flegmon

Uygulama öncesi



Uygulama sonrası



Digital dermatitis

Uygulama öncesi



Uygulama sonrası





İnterdigital dermatitis+ökçe erozyonu

Uygulama öncesi



Uygulama sonrası





Jelin fırça ile kaplanması

Jelin Kullanımı: Yara bölgesine, yara açıklığının boyutuna ve derinliğine göre jelin miktarı değişkenlik gösterir. Ancak, yüzeysel yaralarda jel günde bir kez kullanılmalıdır. Jel her gün veya 3 günde bir uygulanabilir. Her gün kullanımda 7-10 gün, 3 günde bir kullanımda 21-30 gün süreyle kullanılmalıdır. Jelin kullanım öncesi yara ve tırnak bölgesinin temizliği ve kanamanın durdurulması gerekmektedir. Jel kullanımı sonrası jelin yara bölgesinde kuruması sağlanmalıdır (5-10 dk.). Bu süre sonunda isteğe bağlı olarak bandajlanabilir veya bandaj uygulanmayabilir. Hayvan kuru ve temiz bir bölgeye alınabilir veya normal yaşam alanına salınabilir. Bandaj kullanılmadığında jelin doğal kuruması beklenebilir veya kurutma makinası ile kuruması hızlandırılabilir. Jelin kuruması sonrası, hayvan travaydan çıkartılarak kuru toprak zeminden geçirilerek, ahırda yaşam bölgesine sevk edilir. Kurutma süresini beklemek istemeyenler, jelin ayağa sürülmesinden sonra üzerine ince talaş tozu (sterilize edilmiş) dökerekte hayvanı yaşam alanına bırakabilirler. Uygulamalar, süt sağımhanelerinde de kolaylıkla uygulanabilir.

Ruhsat Sahibi ve Üretici Firma: Master Vet Sağlık Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti. Atilla Mah. Alparslan Türkeş Bulv. No:366/Z1 Bucak, Burdur.

